

診療科	呼吸器内科	管理番号		申請医師	
レジメン名称	CBDCA+nab-PTX+Atezo				
対象疾患・ステージ・適応外の有無等	切除不能な局所進行非小細胞肺癌(非扁平上皮癌)				
適応の有無	☒ 保険適応あり ☐ 保険適応なし				
入院実施による算定方法	☐ DPC包括対象 ☒ DPC包括対象外（出来高算定） （薬剤師が診療情報士に確認する）				
本治療の位置づけ	進行非小細胞肺癌患者(非扁平上皮癌)の初回治療				
使用予定日	年 月 日				

	投与順	薬剤	投与量	時間	投与方法	投与スケジュール							
						1日目	8日目	15日目					
治療内容	Rp.1	生理食塩液	50 mL	15min	点滴	●	●	●					
	Rp.2	生理食塩液	250 mL	270 mL/h	点滴	●							
		アテゾリズマブ点滴静注	1200 mg	1hr									
	Rp.3	生理食塩液	50 mL	15min	点滴	●							
	Rp.4	グラニセトロンバッグ	3mg/100mL		点滴	●							
		デキサート注	6.6mg	30min									
	Rp.5	生理食塩水	50 mL		点滴	●	●	●					
		nab-PTX点滴静注	100mg/m2	30min	点滴	●	●	●					
	Rp.6	生理食塩水	50mL	全開	点滴	●	●	●					
	Rp.7	生理食塩水	500mL	300mL/h	点滴	●							
		カルボプラチン	AUC:6	1hr									
	Rp.8	ソルデム3A	500mL	300mL/h	点滴	●							
総投与時間	約6時間												
血管外漏出時のリスク	カルボプラチンはイリタント(炎症性抗がん剤)、nab-パクリタキセルはビシカント(壊死性抗がん剤)、アテゾリズマブはノンビシカント(非壊死性抗がん剤)												
(備考)調製時・投与時の注意点など	アテゾリズマブ:初回60分かけて投与、忍容性が良好であれば2回目以降は30分まで投与時間短縮可能、0.2または0.22 μ mのインラインフィルターを使用する。 nab-PTX: インラインフィルターを使用しないで投与する。												
1サイクル期間	3週間												
総コース数	4サイクルまで 以後はアテゾリズマブの維持療法												