

診療科	消化器外科	管理番号	15
レジメン名称	XELOX 大腸がん		
対象疾患・ステージ・適応外の有無等	切除不能進行再発大腸がん・術後補助化学療法		
本治療の位置づけ	分子標的治療薬を併用しない場合のオキサリプラチンベースの治療レジメンの標準療法の一つ。1次治療としても2次治療としても点滴ベースのフッ化ピリミジンが併用されるFOLFOX療法に対して非劣勢が証明されている。ポートが必要がなく、治療の利便性も高い。		

	投与順	薬剤	投与量	時間	投与方法	投与スケジュール								
						1日目	2日目	3日目	日目	日目	日目	週目	週目	
治療内容	Rp 1	グラニセトロン	100mL	30分	iv	●								
		デキサメタゾン	6.6mL											
	Rp 2	オキサリプラチン	130mg/m ²	2時間	iv	●								
		5%ブドウ糖溶液	500mL											
		デキサメタゾン	3.3mL											
	Rp 3	5%ブドウ糖溶液	50mL	15分	iv	●								
		ゼローダ	2000mg/m ²	分2(朝、夕)	po	day1夕-day15朝								
		デキサメタゾン	8mg	分2(朝、昼)	po		●	●						
総投与時間	3時間弱													
1サイクル期間	3週													