

診療科	消化器外科	管理番号	
レジメン名称	IRIS+BV療法(SIRB 3週1コース)		
対象疾患・ステージ・適応外の有無等	切除不能進行再発大腸がん		
本治療の位置づけ	オキサリプラチンベースの化学療法不応となった症例に対する2次治療としてのイリノテカンベースの治療候補レジメン。FOLFIRI療法に対する非劣勢が証明され、ポートなどが不要な点が利点。		

	投与順	薬剤	投与量	時間	投与方法	投与スケジュール									
						1日目	2日目	3日目	4日目	5日目	6日目	週目	週目		
治療内容	Rp 1	グラニセトンパック	100mL	200mL/h	iv	●									
		デキサート	3.3mg	30分											
		プロイメンド	150mg												
	Rp 2	ヘバシズマブ	7.5mg/kg	30~90分	iv	●									
		生理食塩液	100mL	初回90分、次回60分、3回目以降30分に短縮可											
	Rp 3	生理食塩液	50mL	15分	iv	●									
	Rp 4	イリノテカン	150mg/m ²	90分	iv	●									
		生理食塩液	500mL												
	Rp 5	生理食塩液	50mL	15分	iv	●									
			テガフル・ギメラシル・オテラシル配合剤			po	分2(朝、夕食後)、day1-14								
				体表面積											
			1.25m ² 未満：80mg												
			1.25~1.5m ² 未満：100mg												
			1.5m ² 以上：120mg												
総投与時間															
1サイクル期間		3週													