

| | | | |
|-------------------|---|------|--|
| 診療科 | 血液内科 | 管理番号 | |
| レジメン名称 | G-B療法 | | |
| 対象疾患・ステージ・適応外の有無等 | CD20陽性 濾胞性リンパ腫 | | |
| 本治療の位置づけ | 未治療のCD20陽性濾胞性リンパ腫に対してガザイバと化学療法(CHOP療法、GVP療法またはベンダムスチン)との併用による有効性が検証(GALLIUM試験)され、またリツキシマブ治療抵抗性のCD20陽性低悪性度非ホジキンリンパ腫に対するガザイバとベンダムスチンの併用療法(G-B療法)の有効性も検証(GADOLIN試験)されており、未治療およびリツキシマブ治療抵抗性の濾胞性リンパ腫に対する治療の選択肢の一つとしてG-B療法は位置付けられている。 | | |

| | 投与順 | 薬剤 | 投与量 | 時間 | 投与方法 | 投与スケジュール | | | | | | | |
|-----------------|--|-----------|---------------------|-------|-------|---|-----|-----|-----|-----|--------|---------|------|
| | | | | | | 1日目 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | *1 8日目 | *1 15日目 | __週目 |
| 治療内容 | Rp1 | 生理食塩液 | 50mL | 15分 | 点滴 | ※2 ● | | ● | | | ● | ● | |
| | Rp2 | 生理食塩液 | 500mL | 300分 | ※3 点滴 | ※4 ● | | | | | | | |
| | Rp3 | 生理食塩液 | 50mL | 30分 | ※5 点滴 | ※4 ● | | | | | | | |
| | | デキサート注 | 19.8mg | | | | | | | | | | |
| | Rp4 | 生理食塩液 | 100mL | 60分 | ※5 点滴 | ※4 ● | | | | | | | |
| | Rp5 | ガザイバ注 | 1000mg | 下記参照 | ※5 点滴 | ● | | | | | ● | ● | |
| | | 生理食塩液 | 計250mL | | | | | | | | | | |
| | Rp5 ガザイバ注の投与速度: サイクル1初回投与時…12mL/hから開始し、30分毎に12mL/hずつ上げて96mL/hまで(最大100mL/hまで) サイクル1の2回目以降…25mL/hから開始し、30分毎に25mL/hずつ上げて100mL/hまで(最大100mL/hまで) | | | | | | | | | | | | |
| | Rp6 | アロキシ点滴バッグ | 0.75mg/50mL | 30分 | 点滴 | | ● | | | | | | |
| | Rp7 | トレアキシン注 | 90mg/m ² | 60分 | 点滴 | | ● | ● | | | | | |
| 生理食塩液 | | 250mL | | | | | | | | | | | |
| Rp8 | 生理食塩液 | 50mL | 15分 | ※5 点滴 | ● | ● | ● | | | ● | ● | | |
| | | | | | | ※1…8日目・15日目投与はサイクル1のみ実施 ※2…サイクル1初回投与日は実施なし ※3…メインから投与 ※4…サイクル1初回のみ実施 ※5…サイクル1初回のみ側管から投与 | | | | | | | |
| 総投与時間 | 1日目:サイクル1初回…6時間 サイクル1の2回目以降…3時間45分 2日目: 1時間45分 3日目:1時間30分 8、15日目: 3時間45分 | | | | | | | | | | | | |
| 1サイクル期間 | 28日 | | | | | | | | | | | | |
| 総コース数 | 6コース | | | | | | | | | | | | |
| (併用薬)プレメディケーション | ガザイバ注のInfusion reaction対策として、ガザイバ注投与の30分～1時間前に、抗ヒスタミン薬(ポララミン錠2mg)、解熱鎮痛薬(カロナール400mg)の内服すること。 トレアキシン注投与60分前までにイメンドカプセル(2日目:125mg、3日目:80mg、4日目:80mg)を内服することが推奨される。 | | | | | | | | | | | | |