

診療科	血液内科	管理番号	
レジメン名称	R-CHOP療法		
対象疾患・ステージ・適応外の有無等	非ホジキンリンパ腫(保険適用あり)		
本治療の位置づけ	CD20陽性のaggressive B細胞性非ホジキンリンパ腫の標準化学療法である。低悪性度非ホジキンリンパ腫にも用いられる。		

	投与順	薬剤	投与量	時間	投与方法	投与スケジュール							
						1日目	2日目	3日目	4日目	5日目	日目	週目	週目
治療内容	Rp1	リツキシマブ注	375mg/m <sup>2</sup>	下記参照	点滴	●							
		生理食塩液	10mg/mL										
		リツキシマブ注の投与速度: 初回;25mL/hr→100mL/hr→200mL/hr											
		2回目以降; 100mL/hr→200mL/hr											
	Rp2	グラニセトロン注	3mg	30分	点滴		●						
	Rp3	ピンクリスチン注	1.4mg/m <sup>2</sup>		点滴		●						
		生理食塩液	50mL	5分									
		ピンクリスチン注は最大2mgまで											
	Rp4	ドキシソルピシン塩酸塩	50mg/m <sup>2</sup>	200mL/hr	点滴		●						
		生理食塩液	100mL	30分									
	Rp5	シクロホスファミド注	750mg/m <sup>2</sup>	250mL/hr	点滴		●						
		生理食塩液	250mL	60分									
	Rp6	プレドニゾロン錠	100mg/body/day または 40mg/m <sup>2</sup> /day または 60mg/m <sup>2</sup> /day		経口投与		●	●	●	●	●		
	1サイクル期間	21日											
総コース数	6~8コース												