

診療科	血液内科	管理番号	
レジメン名称	Isa+Pd(1コース目)		
対象疾患・ステージ・適応外の有無等	再発又は難治性の多発性骨髄腫		
本治療の位置づけ	少なくとも2つの標準的な治療が無効又は治療後に再発した患者を対象とするが、通常はボルテゾミブなどのプロテアソーム阻害薬による治療やレナリドミドを含む治療後の再発例やこれらの薬剤が無効の症例に対して、サードレジメンとして実施する。		

投与順	薬剤	投与量	時間	投与方法	投与スケジュール																																				
					1日目	...	8日目	...	15日目	...	21日目	22日目	...	28日目																											
Rp1	ポマリドミド	4mg	空腹時	経口	21日間連続服用							7日間休薬																													
Rp2	デキサメタゾン	40mg [※]	30分	点滴静注	●		●		●			●																													
	生理食塩液	50mL																																							
Rp3	イサツキシマブ	10mg/kg	表1参照	点滴静注	●		●		●			●																													
	生理食塩液	250mL																																							
※...75歳以上は20mg																																									
<table border="1"> <caption>表1</caption> <thead> <tr> <th rowspan="2">投与時期</th> <th colspan="6">投与開始からの投与速度(mg/時間)</th> </tr> <tr> <th>投与開始時</th> <th>60分後</th> <th>90分後</th> <th>120分後</th> <th>150分後</th> <th>180分以降</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>初回投与</td> <td>175</td> <td>225</td> <td>275</td> <td>325</td> <td>375</td> <td>400</td> </tr> <tr> <td>2回目以降の投与</td> <td>175</td> <td>275</td> <td>375</td> <td colspan="3">400</td> </tr> </tbody> </table>															投与時期	投与開始からの投与速度(mg/時間)						投与開始時	60分後	90分後	120分後	150分後	180分以降	初回投与	175	225	275	325	375	400	2回目以降の投与	175	275	375	400		
投与時期	投与開始からの投与速度(mg/時間)																																								
	投与開始時	60分後	90分後	120分後	150分後	180分以降																																			
初回投与	175	225	275	325	375	400																																			
2回目以降の投与	175	275	375	400																																					
総投与時間																																									
1サイクル期間	28日																																								
総コース数	病勢増悪まで																																								

診療科	血液内科	管理番号	
レジメン名称	Isa+Pd(2コース目以降)		
対象疾患・ステージ・適応外の有無等	再発又は難治性の多発性骨髄腫		
本治療の位置づけ	少なくとも2つの標準的な治療が無効又は治療後に再発した患者を対象とするが、通常はボルテゾミブなどのプロテアソーム阻害薬による治療やレナリドミドを含む治療後の再発例やこれらの薬剤が無効の症例に対して、サードレジメンとして実施する。		

治療内容	投与順	薬剤	投与量	時間	投与方法	投与スケジュール																																					
						1日目	...	8日目	...	15日目	...	21日目	22日目	...	28日目																												
治療内容	Rp1	ポマリドミド	4mg	空腹時	経口	21日間連続服用						7日間休薬																															
	Rp2	デキサメタゾン	40mg [*]	30分	点滴静注	●				●																																	
		生理食塩液	50mL																																								
	Rp2	デキサメタゾン	40mg [*]	朝食後	経口			●					●																														
	Rp3	イサツキシマブ	10mg/kg	表1参照	点滴静注	●				●																																	
生理食塩液		250mL																																									
※...75歳以上は20mg																																											
<table border="1"> <caption>表1</caption> <thead> <tr> <th rowspan="2">投与時期</th> <th colspan="6">投与開始からの投与速度(mg/時間)</th> </tr> <tr> <th>投与開始時</th> <th>60分後</th> <th>90分後</th> <th>120分後</th> <th>150分後</th> <th>180分以降</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>初回投与</td> <td>175</td> <td>225</td> <td>275</td> <td>325</td> <td>375</td> <td>400</td> </tr> <tr> <td>2回目以降の投与</td> <td>175</td> <td>275</td> <td>375</td> <td colspan="3">400</td> </tr> </tbody> </table>																	投与時期	投与開始からの投与速度(mg/時間)						投与開始時	60分後	90分後	120分後	150分後	180分以降	初回投与	175	225	275	325	375	400	2回目以降の投与	175	275	375	400		
投与時期	投与開始からの投与速度(mg/時間)																																										
	投与開始時	60分後	90分後	120分後	150分後	180分以降																																					
初回投与	175	225	275	325	375	400																																					
2回目以降の投与	175	275	375	400																																							
総投与時間																																											
血管外漏出時のリスク	イサツキシマブ: 非壊死性抗がん剤(血管外漏出が起こっても、炎症や壊死を起こしにくい薬剤)として扱う。																																										
(備考)調製時・投与時の注意点など	イサツキシマブ: 生理食塩液または5%ブドウ糖液を用いて総量250mLになるように調製する。 点滴バッグはポリオレフィン製、DEHPを含むポリ塩化ビニル製あるいはエチレン-酢酸ビニル製を使用する。 投与の際はポリエーテルスルホン、ポリスルホンまたはナイロン製のインラインフィルター(孔径:0.2又は0.22 μm)を用いる。 希釈後直ちに使用しない場合は2~8℃で保管し、48時間以内に使用する。室温では点滴時間含めて8時間以内に使用する。																																										
1サイクル期間	28日																																										