

診療科	呼吸器内科	管理番号		申請医師	
レジメン名称	ODDP+PEM+Dur+Trem(Short Hydration)				
対象疾患・ステージ・適応外の有無等	切除不能な局所進行非扁平上皮非小細胞肺癌				
適応の有無	<input checked="" type="checkbox"/> 保険適応あり <input type="checkbox"/> 保険適応なし				
入院実施による算定方法	<input type="checkbox"/> DPC包括対象 <input checked="" type="checkbox"/> DPC包括対象外 (出来高算定) (薬剤師が診療情報士に確認する)				
本治療の位置づけ	進行非扁平上皮非小細胞肺癌患者の初回治療として				
使用予定日	2023年 月 日				

	投与順	薬剤	投与量	時間	投与方法	投与スケジュール															
						1日目															
治療内容	Rp.1	ポタコールR	500mL	60分	点滴	●															
		硫酸Mg補正液	8mEq																		
	Rp.2	パロノセトロンパック	100mL	30分	点滴	●															
		デキサメタゾン注	13.2mg																		
	Rp.3	生理食塩液	50mL	15分	点滴	●															
	Rp.4	トレメリムマブ	75mg	60分	点滴	●															
		生理食塩液	100mL																		
	Rp.5	生理食塩液	50mL	60分	点滴	●															
	Rp.6	デュルバルマブ	1500mg	60分	点滴	●															
		生理食塩液	100mL																		
		※体重30kg以下の場合の1回投与量は20mg/kg																			
Rp.7	生理食塩液	50mL	15分	点滴	●																
Rp.8	ペトレキセド	500mg/m ²	10分	点滴	●																
	生理食塩液	100mL																			
Rp.9	ソルデム3A	500mL	60分	点滴	●																
Rp.10	シスプラチン	75mg/m ²	60分	点滴	●																
	生理食塩液	500mL																			
Rp.11	ソルデム3A	500mL	60分	点滴	●																
	フロセミド	20mg																			
総投与時間	約8時間																				
血管外漏出時のリスク	シスプラチン、ペトレキセドはイリタント(炎症性抗がん剤)、デュルバルマブ、トレメリムマブはノンピシカント(非炎症性抗がん剤)																				
(備考)調製時・投与時の注意点など	初回はトレメリムマブを約1時間かけて投与し、その後1時間経過観察する。 (臨床試験において、初回のトレメリムマブ投与後の経過観察は問題がなければ2回目以降省略できるとされていた。呼吸器科医師と相談し、生食投与時間(経過観察時間)は初回で問題なければ15分投与で統一することとなった。) ペトレキセドは総量100mLとなるように調製する。 トレメリムマブ、デュルバルマブはインラインフィルターを使用して投与する必要あり。 シスプラチンは調製後、要遮光。																				

1サイクル期間	3週間
総コース数	4コースまで