

診療科	呼吸器内科	管理番号		申請医師	
レジメン名称	GDDP+PEM+Nivo(Short hydration)				
対象疾患・ステージ・適応外の有無等	根治切除可能な、臨床病期ⅡB、ⅢA、ⅢB期の非扁平上皮非小細胞肺癌（EGFR ALK陽性は含まれない）75歳未満				
適応の有無	<input checked="" type="checkbox"/> 保険適応あり <input type="checkbox"/> 保険適応なし				
入院実施による算定方法	<input type="checkbox"/> DPC包括対象 <input checked="" type="checkbox"/> DPC包括対象外（出来高算定） （薬剤師が診療情報士に確認する）				
本治療の位置づけ	術前化学療法として				
使用予定日	2024年 月 日				

	投与順	薬剤	投与量	時間	投与方法	投与スケジュール													
						1日目													
治療内容	Rp.1	生理食塩水	50 mL	200 mL/hr	点滴	●													
				15min															
	Rp.2	ニボルマブ	360 mg	172 mL/h	点滴	●													
		生理食塩水	100 mL	30min															
	Rp.3	生理食塩水	50 mL	200 mL/hr	点滴	●													
				15min															
	Rp.4	ポタコールR	500 mL	500 mL/h	点滴	●													
		硫酸Mg補正液	8 mEq	60 min															
	Rp.5	パロ/セトロンバッグ	100 mL	600 mL/h	点滴	●													
		デキサメタゾン注	13.2 mg	10 min															
	Rp.6	生理食塩液	100 mL	600 mL/h	点滴	●													
		ペメトレキセド	500 mg/m ²	10 min															
	Rp.7	ソルデム3A	500 mL	500 mL/h	点滴	●													
				60 min															
	Rp.8	生理食塩液	500 mL	500 mL/h	点滴	●													
		シスプラチン	75 mg/m ²	60 min															
	Rp.9	ソルデム3A	500 mL	500 mL/h	点滴	●													
		フロセミド	20 mg	60 min															
総投与時間	約5時間30分																		
血管外漏出時のリスク	ニボルマブとペメトレキセドはノンビシカント(非壊死性抗がん剤)、シスプラチンはイリタント(炎症性抗がん剤)																		
1サイクル期間	3週間																		
総コース数	3コースまで繰り返し投与																		
(併用薬)プレメディケーション	ペメトレキセド: 骨髄抑制副作用軽減のため、メコバラミン注射液 500 μg 2A 筋注 (9週毎)、 調剤用バンピタン末 1g 1Xを毎日処方する アブレピタント[day1: 125mg, day2-3: 80mg(必要に応じて5日間まで)]内服 デカドロン(day2-4: 8mg)																		