

レジメン登録申請書

診療科	血液内科	申請医師		提出日	年 月 日
レジメン名称	高リスクAML ビキセオスinduction				
対象疾患・ステージ等	高リスクAML				
適応の有無	☒ 保険適応あり ☐ 保険適応なし				
入院実施による算定方法	☐ DPC包括対象 ☒ DPC包括対象外（出来高算定） （薬剤師が診療情報士に確認する）				
本治療の位置づけ	未治療の高リスクAML（治療関連AML、MDSの既往歴のあるAML）に対する初回寛解導入療法として推奨される標準治療のひとつに位置づけられる。				
使用予定日	年 月 日				

	投与順	薬剤	投与量	時間	投与方法	投与スケジュール											
						1日目	2日目	3日目	4日目	5日目	6日目	7日目	8日目	...	21日目		28日目
治療内容	Rp1	グラニセトロン	3mg	30分	div	●		●		●							
	Rp2	生理食塩液	50mL	全開	div	●		●		●							
	Rp3	ビキセオス	100U/m ²	90分	div	●		●		●							
		注射用水	100mL														
		生理食塩液	500mL														
	Rp4	生理食塩液	50mL	全開	div	●		●		●							
		【2サイクル目】															
	Rp1	グラニセトロン	3mg	30分	div	●		●									
	Rp2	生理食塩液	50mL	全開	div	●		●									
	Rp3	ビキセオス	100U/m ²	90分	div	●		●									
		注射用水	100mL														
		生理食塩液	500mL														
	Rp4	生理食塩液	50mL	全開	div	●		●									
総投与時間	2時間																
血管外漏出時のリスク	・ビキセオス：壊死性																
（備考）調製時・投与時の注意点など	・1Vあたり注射用水19mLで溶解する ・激しく振とうしない ・インラインフィルターは使用しない																
1サイクル期間	14日																
総コース数	最大2コース																

化学療法委員会は 奇数月の第1火曜日です。レジメン申請書の提出は化学療法委員会2週間前までにお願いします。