

## レジメン登録申請書

診療科	消化器内科	申請医師		提出日	6年 7月 5日
レジメン名称	Niv+Ipi(悪性黒色腫)				
対象疾患・ステージ等	根治切除不能な悪性黒色腫				
適応の有無	<input checked="" type="checkbox"/> 保険適応あり <input type="checkbox"/> 保険適応なし				
入院実施による算定方法	<input type="checkbox"/> DPC包括対象 <input checked="" type="checkbox"/> DPC包括対象外(出来高算定)      (薬剤師が診療情報士に確認する)				
本治療の位置づけ	根治切除不能な悪性黒色腫の一次治療				
使用予定日	年 月 日				

治療内容	投与順	薬剤	投与量	時間	投与方法	投与スケジュール																
						1日目	22日目	日目	週目	週目												
治療内容	Rp.1	生理食塩水	50mL	15分	点滴	●																
	Rp.2	オブジーボ	80mg	30分	点滴	●																
		生理食塩水	100mL																			
	Rp.3	生理食塩水	50mL	30分	点滴	●																
	Rp.4	ヤーポイ	3mg/kg	30分	点滴	●																
		生理食塩水	30mL																			
	Rp.5	生理食塩水	50mL	15分	点滴	●																
総投与時間	2時間																					
血管外漏出時のリスク	オブジーボならびにヤーポイはノンピシカント(非炎症性抗がん剤)																					
(備考)調製時・投与時の注意点など	先にオブジーボを30分以上かけて点滴静注する。投与完了後30分以上間隔をあげ、ヤーポイを30分かけて点滴静注する。オブジーボ・ヤーポイはインラインフィルターを用いて投与する。ヤーポイは生食または5%ブドウ糖液を用いて1-4mg/mlの濃度に希釈して投与する																					
1サイクル期間	21日																					
総コース数	4コースまで、その後はニボルマブ単剤1回240mを2週間隔、または、1回480mgを4週間隔で投与する																					