

診療科	消化器外科	管理番号	
レジメン名称	IRIS+B-mab(4週1コース)		
対象疾患・ステージ・適応外の有無等	切除不能進行再発大腸がん		
本治療の位置づけ	FOLFIRIとIRISでは、FIRIS studyで非劣勢が証明されている。現在はIRI+S-1+BV療法の臨床試験が第Ⅱ相試験として報告され、良好な成績が示されている。また大腸癌治療ガイドライン2016年版にて、オキサリプラチンを含むレジメンに不応・不耐となった場合の2次治療として記載されている。		

	投与順	薬剤	投与量	時間	投与方法	投与スケジュール								
						1日目	2日目	15日目	16日目	17日目	18日目	週目	週目	
治療内容	Rp 1	グラニセトンパック	100mL	200mL/h	iv	●		●						
		デキサート	3.3mg	30分										
		プロイメンド	150mg											
	Rp 2	ヘバシズマブ	5mg/kg	30~90分	iv	●		●						
		生理食塩液	100mL	初回90分、次回60分、3回目以降30分に短縮可										
	Rp 3	生理食塩液	50mL	15分	iv	●		●						
	Rp 4	イリノテカン	100mg/m <sup>2</sup>	90分	iv	●		●						
		生理食塩液	500mL											
	Rp 5	生理食塩液	50mL	15分	iv	●		●						
		テガフル・ギメラシル・オテラシル配合剤				po	分2(朝、夕食後)、day1-14							
				体表面積										
				1.25m <sup>2</sup> 未満：80mg										
			1.25~1.5m <sup>2</sup> 未満：100mg											
			1.5m <sup>2</sup> 以上：120mg											
総投与時間	約2.5~3.5時間													
1サイクル期間	4週間													